



手術前沐浴

皮膚清潔與術後傷口感染的關係

手術前一天或手術當日以肥皂或含抗菌劑之沐浴劑沐浴，充分的清潔可有效降低皮膚上菌落，進而減少手術後傷口感染。

清潔皮膚手術前沐浴的好處

- 降低皮膚上細菌的菌落
- 降低術後傷口感染

手術前沐浴的方法

- 術前一天或手術當日以肥皂或含抗菌劑之沐浴乳進行身體清潔。
- 由上而下全身塗抹搓洗、沖淨後再重複搓洗一次(步驟如背面圖示)。
- 加強清洗手術部位。

含葡萄糖酸氯己定 (Chlorhexidine, CHG) 沐浴乳

- 含葡萄糖酸氯己定 (Chlorhexidine) 成分之沐浴乳，可與皮膚結合，可持續作用 48 小時，長時間抗菌且溫和不刺激皮膚。
- 有效預防手術部位感染，阻止病原菌入侵及移生。

含抗菌劑沐浴乳優點

	肥皂/沐浴乳	含 CHG 抗菌劑沐浴乳
功能效用	清潔、去汙	清潔、去汙、抗菌
抗菌能力	無	強效
作用時間	無	立即、持續、殘餘抗菌效果

手術前使用抗菌沐浴乳建議步驟



1. 直接使用抗菌沐浴乳(2%CHG)清洗下巴以下之頸部。
(請勿直接使用於臉部)



4. 確認全身皆有接觸抗菌沐浴乳(2%CHG)，需停留至少 30秒後才可沖洗。



2. 揉搓出泡後，由上往下的方向作清洗，稍用力搓洗身體並加強易出汗部位。(如腋窩)



5. 沖洗乾淨後，再重複一次步驟1~4。



3. 持續將抗菌沐浴乳(2%CHG)塗抹於全身前後，由上往下清洗致跨下。(請遵循醫護人員教育加強特定部位之清洗)。



6. 清洗完畢後使用乾淨的浴巾擦乾並換上乾淨的衣物。
(請勿在塗抹乳液等物品)

使用抗菌沐浴乳注意事項

- 本製劑限於皮膚外用不得內服，亦不得用於耳內、眼睛內或黏膜。
- 不可與清潔劑或其他化學藥品混合使用。(例：碘酒、優碘、生理食鹽水、乳液...等)
- 如有刺激感、皮膚炎、過敏性反應(皮膚紅腫)，請用大量清水沖洗，立即停止使用並就醫。

警語：對成份過敏者不能使用。

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡
電話：(04) 22052121 分機 1940
HE10281