



抽脂手術

抽脂手術Liposuction

在身體較隱密處(如鼠蹊部、肚臍等)，創造出約1公分的小洞。利用抽脂器械進行手術。有時可利用水刀抽脂、超音波抽脂幫助手術進行。

- 抽脂前，將生理食鹽水、血管收縮藥物、麻醉藥等混合液先灌注到預定要抽吸的脂肪組織部位內。待脂肪細胞膨脹，醫師會從切口置入器械，利用器械將脂肪抽吸出來。
- 抽脂手術包括全身各處脂肪堆積的部位，包括下腹部、腰部、大腿的內外側、臀部、膝蓋內側及上臂。
- 非美容性的抽脂手術：對於大的脂肪瘤、巨乳症、重建手術使用的皮瓣過於肥厚，抽脂手術可提供便捷的輔助性治療。
- 抽脂手術並不是用來治療體重過重的外科手術，體重過重者需先減重後才能接受各種體形雕塑手術。

水刀抽脂

傳統手術所使用的抽脂管容易傷害皮下的神經、血管、纖維結締組織等，微粹脂水刀抽脂系統與過去傳統抽脂手術的不同在於，醫師可依照不同部位使用不同段水力的調節，利用扇形水柱溫和將脂肪沖散，保留神經、血管等組織，術後恢復的時間亦較傳統抽脂短。微粹脂亦有專屬的集脂桶，使用沉澱法無須離心，可減低對脂肪的破壞，過濾後亦可進行脂肪填補。

抽脂手術適應部位

手臂內側捏起脂肪超過2公分的蝴蝶袖、腹部及大腿環狀部位脂肪堆積、臀型弧度不佳、腰部、大腿、小腿、背部、腹部、男性女乳症等。

手術注意事項

- 抽脂手術前一週開始勿服用抗凝血藥物(阿斯匹靈等)，如果有服用者，請主動告知醫師。亦不可服用營養品(如牛樟芝、銀杏、維他命、魚油等)，及減少攝取人蔘等促進血流食物。
- 手術後立刻穿上緊身衣褲可減少術後的血腫，3個月後手術穩定，即有成效顯示；3至6個月內應穿著緊身衣，若能持續穿著更可維持良好手術成效；與醫師配合定期回診，追蹤患部的變化。

- 手術後一星期內請擦拭身體勿沖澡，如需沖澡請貼上防水膠，淋浴後再換藥，預防傷口感染發炎，患部請使用生理食鹽水清潔再依醫囑塗抹藥膏。
- 臥床休息：小部位的抽脂並不影響上班，大範圍的抽脂，視情況可休息兩、三天。可在一星期後恢復正常的工作，建議四星期後才可進行劇烈運動。
- 手術後皮膚感覺較遲鈍，因為抽吸脂肪的同時也可能損害了某些皮膚感覺神經纖維末梢，約在3至6個月會逐漸恢復。
- 手術後禁止喝酒、抽菸及吸入二手菸，以免影響傷口癒合。
- 患部按摩：手術兩週後可按摩患部，有助於消腫及改善皮膚表面的不平整，約三個月到半年會逐漸改善。

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡
電話：[\(04\)22052121](tel:(04)22052121) 分機 2020