



玻尿酸注射

人體肌膚當中原本就含有玻尿酸，隨著年齡的增長，玻尿酸也跟著流失，久而久之，肌膚會逐漸失去彈性、光澤，開始老化，出現皺紋、鬆弛以及粗糙暗沉的現象，因此適當地補充玻尿酸可以增加皮膚的保水能力，達到除皺的效果，也可用在隆鼻、下巴雕塑、蘋果肌、法令紋、填補凹洞、豐唇、填淚溝...等微整型。

注射部位

玻尿酸主要能改善靜態紋路，例如淚溝、蘋果肌、法令紋、太陽穴凹陷、眼窩凹陷、頰部凹陷、疤痕凹陷、深層抬頭紋、眉間紋、鼻子、下巴修飾、眼周細紋、豐唇、耳垂再造、臉型雕塑。

風險

本治療除了塗抹麻醉藥物引起的皮膚紅疹、過敏，癢、接觸性皮膚炎常見的有：

- 治療後暫時的紅腫、或是注射導致的皮膚瘀青。
- 玻尿酸可能會有局部硬塊、輕微疼痛、紅腫、過敏、肉芽反應。
- 使用阿斯匹靈或抗凝血藥物病人建議停藥 3 天後方得施打，以避免明顯之瘀青。
- (註：特殊體質或病況會有不同的風險，請務必告訴醫師您完整的病情)。

注意事項

- 注射治療後，可能會有腫脹、發紅、疼痛、皮下瘀血，這些於注射後 1 ~ 2 週會自動減輕。
- 注射當天不要化妝、喝酒、1週內不要使用三溫暖和烤箱。
- 注射後 5 ~ 7 日追蹤，1 週內視情況追加注射。
- 注射後可於接受治療部位觸摸到硬塊，此為正常現象，治療後，請勿按摩注射部位。

