



用藥指導- Ibuprofen

商品名：Idofen Susp. Syrup

中文名：舒抑痛口服懸液

成分含量：20 毫克/c.c · 60 c.c /瓶

作用：消炎，鎮痛，解熱

用法與劑量

- 6個月 ~ 12歲孩童：
- 發燒小於或等於 39 °C：每 6 ~ 8 小時，每次劑量 5 毫克(0.25 c.c) / 公斤
- 發燒大於 39 °C 或輕中度疼痛：每 6 ~ 8小時，每次劑量 10 毫克(0.5 c.c) / 公斤
- 每日最大極量：40 毫克(2 c.c) / 公斤

醫師/藥師指示服藥方式

每天	早餐	中餐	晚餐	睡前	特別指示
用量					

藥品存放方式

- 存放於密閉容器內，室溫下(15 ~ 30 °C)、乾燥處，避光貯存。
- 注意避免放在孩童容易取得的地方。

如果有下列任何不尋常症狀時，應儘快告知醫師/藥師

蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨嗓音異常嘶啞；臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

注意事項

若您對此藥有任何疑慮，請聯絡醫師或藥師。

- 如果孩子忘記（錯過）一次用藥，一旦想起請儘早讓小孩服用錯過的藥物。
- 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到的正常用藥時間。
- 避免同時服用 2 劑或額外劑量。
- 請勿將藥分給其他小孩吃。
- 看診時請隨身攜帶一份藥物的清單（處方藥、健康食品、維他命製劑、非處方藥）給醫師。
- 嚴格遵照醫師指示讓孩子按時定量服藥，在未徵詢醫師同意前，請勿擅自決定開始、停止服用任何藥物或變更藥物劑量。

兒童用藥紀錄表

時間點	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
早上							
中午							
晚上							
睡前							

本單張無法詳載完整藥品資訊，若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡
電話：(04) 22052121 分機 3154/5126
中國醫藥大學兒童醫院