



## 用藥指導-Procateterol

商品名：Exdila liquid

中文名：喘解液

成分含量：5 毫微克/c.c · 60 c.c/瓶

作用：支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。

### 用法與劑量

6歲以上孩童：睡前或一天兩次，每次 25 毫微克 ( 5 c.c )

6歲以下孩童：一天 2 ~ 3 次，每次 1.25 毫微克 ( 0.25. c.c )/公斤

3 ~ 6 歲 - 每次 4 ~ 5 c.c

1 ~ 3 歲 - 每次 3 ~ 4 c.c

未滿 1 歲 - 每次 2 ~ 3 c.c

### 醫師/藥師指示服藥方式

每天	早餐	中餐	晚餐	睡前	特別指示
用量					

### 藥品存放方式

- 存放於密閉容器內，室溫下( 15 ~ 30 °C )、乾燥處，避光貯存。
- 注意避免放在孩童容易取得的地方。

**如果有下列任何不尋常症狀時，應儘快告知醫師/藥師**

蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨心悸、顏面潮紅、耳鳴、頭痛、胃部不適、口渴、倦怠等。

## 注意事項

若您對此藥有任何疑慮，請聯絡醫師或藥師。

- 如果孩子忘記（錯過）一次用藥，一旦想起請儘早讓小孩服錯過的藥物。
- 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到的正常用藥時間。
- 避免同時服用 2 劑或額外劑量。
- 請勿將藥分給其他小孩吃。
- 看診時請隨身攜帶一份藥物的清單（處方藥、健康食品、維他命製劑、非處方藥）給醫師。
- 嚴格遵照醫師指示讓孩子按時定量服藥，在未徵詢醫師同意前，請勿擅自決定開始、停止服用任何藥物或變更藥物劑量。

## 兒童用藥紀錄表

時間點	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
早上							
中午							
晚上							
睡前							

本單張無法詳載完整藥品資訊，若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。

---

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡  
電話：(04) 22052121 分機 3154/5126  
中國醫藥大學兒童醫院