



## 異丙醇中毒

- 吸入異丙醇 400 ppm 濃度以下，會輕微刺激呼吸道。若在高濃度的環境下，會造成暈眩，甚至昏迷。
- 誤食異丙醇有可能會造成暈眩、噁心、嘔吐等症狀。大量食用會造成意識喪失及死亡。
- 若發現吸入異丙醇之病人，應先移除污染源或將病人移到新鮮空氣處。倘若病人停止呼吸應立即施予人工呼吸後再就醫。
- 若發現誤食異丙醇者，應先給病人服用大量的水後再送醫治療。

檢驗表單	有有機溶劑檢驗單 (CM-L501)
檢驗項目	異丙醇 ( Isopropanol )
參考範圍	< 40 mg/mL
採檢容器 及 檢體量	 Li-Heparin tube 最低採檢量 3 ml
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消毒抽血部位後，請待至消毒液體完全乾燥，再行抽血</li> <li>2. 請緊閉抽血試管蓋，避免揮發</li> </ol>

檢驗方法	UV-Vis Spectrometer
可送檢時間	星期一~ 星期五 08 : 00 ~ 17 : 00 ( 例假日休 )
報告完成時間	送達毒物科實驗室簽收後， 2個工作天。 急診：簽收後 當天
院內分機	( 04 ) 2202121 轉 7613

---

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡  
電話：(04) 22052121 分機 7613  
HE-17011