



## 砷中毒

急性砷中毒症狀有腹痛、血便、溶血、休克、急性肝炎、腎衰竭及抽搐；慢性中毒會有皮膚疹、胃腸症狀及末梢神經炎。

砷的暴露主要是透過食物和飲水。食物中可能含有的砷以及農藥常使用的都是有機砷，毒性比較低。飲水中的砷主要為無機的形態，毒性很強，飲水會被砷污染，有可能是地層構造的自然因素，也可能是工業污染所致。

檢驗表單	重金屬檢驗單(CM-L502)	
檢驗項目	血中砷 Blood -Arsenic,As	尿中砷 Urine-Arsenic,As
參考範圍	2-23 $\mu\text{g}/\text{dl}$	< 100 $\mu\text{g}/\text{dl}$
採檢容器 及 檢體量	 Li-Heparin tube 最低採檢量4ml	 S-Y urine Tube 最低採檢量5ml
採檢注意事項	避免凝血與溶血	請緊閉蓋子，避免外漏汙染。

檢驗方法	Atomic Absorption Spectrometry
可送檢時間	星期一 ~ 星期五 08 : 00 ~ 17 : 00 ( 例假日休 )
報告完成時間	不含例假日 · 14個工作天
院內分機	( 04 ) 2202121 轉 7613

---

若有任何疑問 · 請不吝與我們聯絡  
電話 : (04) 22052121 分機 7613  
HE-17009