



## 肝切片檢查

肝切片檢查其實是以一種特殊設計的針，經由局部麻醉後的皮膚，進入肝臟抽取些肝組織，供顯微鏡下檢查之用，除去麻醉時間外，管針進出身體的時間約5秒，但腫瘤切片須能閉氣30秒，檢查後需要側躺以砂袋壓迫針口，不需縫合，但腫瘤切片患者有出血風險，必須住院執行檢查。

### 檢查目的

評估罹患慢性肝炎、急性肝炎、肝腫瘤、肝腫大或肝硬化時的嚴重度或確定正確的病因。

### 檢查前注意事項

- 檢查前 2 小時內請勿進食。
- 避免服用影響凝血功能之藥品，如 Aspirin、Wafarin 等（要停用前請先與您的醫師討論）。
- 檢查當天會由轉送中心人員推床送您至檢查室，護理人員將準備砂袋，並請您準備束腹帶及拖鞋；若門診排檢者請依排檢時間至超音波室報到。
- 請穿著上下兩件式輕便服裝，不需更換手術隔離衣。
- 詳讀檢查同意書及說明書，請充分了解檢查的併發症，並通知一位家屬陪同。因排檢時間為預定檢查時間，實際需依當日情況而可能有所調整。
- 若遇情況特殊病人請與檢查室聯絡或請醫師陪同，依情況機動調整時間或徵詢醫師同意予以進食、服藥或懸吊輸液，有低血糖疑慮時請隨身攜帶糖果，避免因低血糖而危及安全。

### 檢查中注意事項

- 病人換至檢查室診察升降床上，一般採平躺姿勢，但會視情況採側傾斜，醫師會在受檢者患部做皮膚消毒準備工作。
- 鋪上無菌單巾及備妥檢查用物，檢查過程須配合醫師的指令做深呼吸，閉、吐氣的動作。
- 包括準備工作，一般檢查時間大約 20 ~ 30 分。

### 檢查風險

- 禁忌症：不合作之病人、出血傾向。
- 併發症及副作用：
  - 穿刺部位疼痛或瘀血
  - 血壓降低
  - 腹腔、胸腔或膽道出血
  - 氣胸、膽道穿刺、抽搖等
  - 小於千分之一的死亡率

### 檢查後注意事項

- 檢查後需以砂袋側壓 6 小時，每小時可稍微翻身平躺 1 分鐘再壓回原位，或以束腹帶固定砂袋加壓六小時，但飲食、大小便均不可坐起或下床。
- 檢查後可照常進食，24 小時內避免劇烈運動或用力，覆蓋患部紗布 24 小時後除去，之後才可沐浴。
- 檢查後 3 天~ 1 週內，儘量避免提過重物品。
- 檢查後如有腹部疼痛、呼吸不順、冒冷汗、心跳加速、意識不清，應立即告知醫護人員。
- 若您返家後發生以上任何不適情況，請立即回內科部消化系門診或逕赴本院急診就醫治療、通知醫護人員。

---

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡  
電話：[\(04\) 22052121](tel:(04)22052121)分機 2221  
HE-T2050