



## 腰椎穿刺術

### 檢查目的

- 診斷用：抽取腦脊髓液做各種檢查，協助診斷。例如：腦炎、多發性硬化症。
- 治療用：藉由腰椎注射藥物，協助治療。
- 麻醉用：可注射麻醉藥物行半身麻醉。

### 檢查前準備

- 醫師會先向您充份解釋檢查的目的及過程，以取得您的合作。
- 填寫檢查同意書。
- 檢查前先解小便、大便，減少腹部壓力。

### 檢查過程

- 檢查時的姿勢採側臥，彎曲雙腳，身體盡量呈蝦米狀，以利醫師做檢查。
- 穿刺部位：一般多從腰椎第 3 ~ 4 節或第 4 ~ 5 節間。
- 過程約15分鐘 ~ 數十分鐘不等，視整體情況而定。

### 檢查後注意事項

- 檢查後會使用紗布及寬膠固定壓破穿刺處，若無滲血情形，紗布可於 1 天後自行除去，無需換藥。
- 部分病人於檢查後可能發生頭痛、噁心、嘔吐...等症狀，請與醫護人員聯絡。
- 檢查後需平躺 6 ~ 8 小時，並請多喝開水。
- 檢查後若有頭痛、噁心、嘔吐等不適情形，請與醫護人員聯絡。