



腸胃炎

腸胃炎最常看到的症狀是嘔吐、腹瀉。會發生在任何年齡層，若發生在嬰幼兒合併脫水或嚴重感染時，往往需要住院治療。所以現在就請您一起來認識腸胃炎引起的原因、症狀及如何照顧家中的小寶貝。

致病原因

引起腸胃炎的原因通常有：1) 病毒性感染-常見的病毒有輪狀病毒與諾羅病毒等。2) 細菌性感染-常見的致病菌有沙門氏桿菌、大腸桿菌、痢疾桿菌、腸炎弧菌或寄生蟲感染等。3) 其他：食物過敏、腸胃道結構異常、內分泌失調等。

症狀

- 病毒性感染-腹瀉、噁心、嘔吐、發燒、腹痛、頭痛及虛弱。
- 細菌性感染-除了病毒性感染的症狀外，可能還會有血便或膿便，亦即大便中混合著血絲、透明黏液等。

照護的原則

- 大多不需要特別的抗病毒或細菌藥物治療，也就是沒有所謂的“特效藥”。
- 急性腹瀉並不需要禁食，除非嚴重嘔吐、或嚴重的腹脹、腹痛導致無法進食。
- 注意補充水分與營養，避免脫水。
- 飲食內容應以清淡(稀飯、白吐司、陽春麵條)為主。
- 避免高油或高糖分的食物，因為此類食物除了腸胃道無法吸收之外，還會刺激腸道，使嘔吐、腹瀉的情況加劇。
- 建議暫時減少乳製品的攝取(嬰幼兒服用母乳或配方奶者，則不在此限)，或改用無乳糖配方奶。
- 必要時可以使用醫療用口服電解質液，補充體內流失的電解質。
- 密切觀察孩子是否有脫水跡象，
 - * 嘴唇黏膜乾燥。
 - * 皮膚摸起來較為乾燥。
 - * 哭的時候眼淚減少或不見眼淚。

- * 小便量減少(換尿布若出現下列任一症狀，須返診請醫師診治：次數減少、尿布重量減輕、尿變黃)。
- * 眼球周圍的眼眶下陷。
- * 活動力減低甚至較為躁動。
- * 前囟門凹陷。

如何預防家人被傳染？

- 經常洗手可以降低感染的機會，飯前、便後及烹調食物前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。
- 避免食用可能被汙染的食物。
- 妥善處理病童的嘔吐物和排泄物，以及弄髒的床單或衣物(處理者建議要戴口罩和手套處理)。
- 為預防疾病傳播，應澈底消毒被污染物體的表面，可以使用熱水 (> 85 °C) 或稀釋過的漂白水 (濃度配置為 0.1 %) 清洗擦拭、抹乾，以利減少病毒及細菌的蔓延。

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡
電話：[\(04\) 22052121](tel:(04)22052121) 分機 2128

中國醫藥大學兒童醫院