



中國醫藥大學附設醫院  
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地 址：台中市育德路 2 號

電 話：(04)22052121-3154

# 藥 劑 快 訊

## 本期目次

### 1. 藥品異動資訊 (P1)

- (1) 臨時採購
- (2) 更換廠牌
- (3) 包裝異動

### 2. 預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P10)

外觀相似


### 3. 藥物安全警訊 (P11)

- (1) Fingolimod 成分藥品安全資訊

# 1. 藥品異動資訊

## (1) 臨時採購

日期	108.07.20	
學名/規格	FOLLITROPIN ALFA, Lutropin alfa (450/225 IU)/0.72ml/Pen	
商品名	Pergoveris 倍孕力注射筆	
適應症	荷爾蒙治療	
備註	婦產科臨採 須冷藏保存(2~8°C)	
易混淆品項	Pergoveris (150 IU/75 IU)/Vial 倍孕力凍晶注射劑	



日期	108.07.30	
學名/規格	Cabozantinib 40mg/Tab	
商品名	Cabometyx 癌必定膜衣錠	
適應症	治療晚期腎細胞癌、肝細胞癌	
備註	泌尿部臨採	
易混淆品項	Cabometyx 20mg/Tab 癌必定膜衣錠 Cabometyx 60mg/Tab 癌必定膜衣錠	



日期	108.07.29	
學名/規格	Durvalumab 120 mg/2.4mL/Vial	
商品名	Imfinzi 抑癌寧注射劑	
適應症	適用於治療患有局部晚期、無法手術切除的非小細胞肺癌，且接受放射治療合併含鉑化療後病情未惡化的病人	
備註	須冷藏保存(2~8℃)	
易混淆品項	Imfinzi <b>500 mg/10mL/Vial</b> 抑癌寧注射劑	

## (2) 更換廠牌

日期	108.07.05	變更項目	由榮民廠換為國嘉廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Rifampicin 300mg/Cap		
商品名	Rifampicin 利肺寧膠囊	Rifampicin 立泛黴素膠囊	
適應症	肺結核、奈瑟氏腦膜炎球菌帶原者		
備註	原品項"榮民"利肺寧 TRIFAM3 停產，進用替代		

日期	108.07.26	變更項目	由拜耳廠換為利達廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Acarbose 100 mg/Tab		
商品名	Glucobay 糖祿錠	Litacarbose 衛糖錠	
適應症	非胰島素依賴型糖尿病之治療		
備註	Acarbose 100 mg/Tab 缺貨，暫以本品替代		

日期	108.07.29	變更項目	更換藥證
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Trastuzumab 440 mg/Vial		
商品名	Herceptin 賀癌平凍晶注射液		
適應症	早期乳癌、轉移性乳癌、轉移性胃癌		
備註	須冷藏保存(2~8°C)		



日期	108.07.31	變更項目	由輝瑞廠換為中化廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Doxazosin 4mg/Tab		
商品名	Doxaben XL 可迅持續藥效錠 4 毫克	Xadosin SR 薩多心持續性藥效錠 4 毫克	
適應症	高血壓，良性前列腺肥大		
備註	Doxaben 4mg 廠商缺貨，以本品暫代		

**(3) 包裝異動**



日期	108.08.06	變更項目	包裝外觀變更
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Teicoplanin 200mg/Vial		
商品名	Targocid 得時高凍晶注射液		
適應症	葡萄球菌感染所致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎		

日期	108.08.06	變更項目	新增條碼
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	K3PO4(K 88mEq/P 60mmol) in H2O 100mL/Bot		
商品名	磷酸鉀		
適應症	體內磷缺乏及不平衡所引起的症狀		
備註	須冷藏保存(2~8°C)		
易混淆品項	7.5mL KCL+7.5mL K3PO4 in 0.45% NaCl 500ml/Bot 5mL KCL+5mL K3PO4 in 0.45% NaCl 500mL/Bot		

日期	108.08.06	變更項目	新增條碼
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	KCL 100 mEq in 50 ml Water 100 ml/Bot		
商品名	100meq KCL 高濃度 in 50c.c Water		
適應症	缺鉀狀態		
備註	須冷藏保存(2~8°C)		
易混淆品項	<p>PotaSSIUM Chloride 15% 20mL/Amp 氯化鉀注射液</p> <p>0.149%KCl in 5% Dextrose and 0.33% NaCl Injection 500mL/Bot</p> <p>0.149% 氯化鉀/5%葡萄糖及 0.33%氯化鈉注射液</p> <p>10meq KCL in 2.5/ 0.45% G/S 500mL/Bag</p> <p>10mEq KCL in 5/ 0.9% G/S 500mL/Bot 0.149%氯化鉀/(5%葡萄糖及 0.9%氯</p> <p>10mEq KCL in Glucose 5% 500mL/Bot 0.149%氯化鉀/5%葡萄糖注射液</p> <p>10meq KCL in 台大 5 號 400mL/Bot</p> <p>0.149% KCL(10mEq) in Saline 500mL/Bot 0.149% 氯化鉀注射液</p> <p>20meq KCL in CVVH A 3000mL/Bot</p> <p>0.298% KCL(20mEq) in Saline 500mL/Bot 0.298% 氯化鉀注射液</p> <p>KCL 20meq/5% Glucose 100mL/Bot 1.49%氯化鉀/5%葡萄糖注射液</p> <p>40meq KCL in Saline 500mL/Bot</p> <p>4mEq KCL in 6mL disWater 8mL/Syringe</p>		

日期	108.08.10	變更項目	包裝外觀變更
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Hydrocortisone acetate ointment 1% 5 g/Tube (10 mg/g)		
商品名	Cort.S. ointment 1% 皮質醇軟膏		
適應症	濕疹或皮膚炎		
易混淆品項	Hydrocortisone Injection 100mg 舒爾體爽注射劑 100 毫克		



日期	108.08.12	變更項目	鋁箔包裝變更
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Cyclosporin 25 mg/Cap		
商品名	Sandimmun Neoral 新體睦軟膠囊		
適應症	預防器官移植及骨髓移植後之移植排斥，預防移植反宿主疾病		
易混淆品項	<p>Immurin 100mg/Cap 因睦寧軟膠囊 100 毫克</p> <p>Sandimmun Neoral <b>100mg/Cap</b> 新體睦軟膠囊</p> <p>Sandimmun Neoral Syrup 100mg/mL 50mL/Bot 新體睦口服溶液</p> <p>Sandimmun 50mg/mL/Amp 生體睦靜脈輸注濃縮液</p> <p>Restasis 0.05% ophthalmic emulsion 0.4mL/Vial 麗眼達眼用乳劑</p>		

日期	108.08.30	變更項目	新增條碼
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	KCL 40meq in Saline 500mL/Bot		
商品名	40meq KCL in Saline		
適應症	缺鉀狀態		
備註	須冷藏保存(2~8°C)		
易混淆品項	<p>PotaSSIUM Chloride 15% 20mL/Amp 氯化鉀注射液</p> <p>0.149%KCl in 5% Dextrose and 0.33% NaCl Injection 500mL/Bot</p> <p>0.149% 氯化鉀/5%葡萄糖及 0.33%氯化鈉注射液</p> <p>10meq KCL in 2.5/ 0.45% G/S 500mL/Bag</p> <p>10mEq KCL in 5/ 0.9% G/S 500mL/Bot 0.149%氯化鉀/(5%葡萄糖及 0.9%氯</p> <p>10mEq KCL in Glucose 5% 500mL/Bot 0.149%氯化鉀/5%葡萄糖注射液</p> <p>10meq KCL in 台大 5 號 400mL/Bot</p> <p>0.149% KCL(10mEq) in Saline 500mL/Bot 0.149% 氯化鉀注射液</p> <p>20meq KCL in CVVH A 3000mL/Bot</p> <p>0.298% KCL(20mEq) in Saline 500mL/Bot 0.298% 氯化鉀注射液</p> <p>KCL 20meq/5% Glucose 100mL/Bot 1.49%氯化鉀/5%葡萄糖注射液</p> <p>40meq KCL in Saline 500mL/Bot</p> <p>4mEq KCL in 6mL disWater 8mL/Syringe</p>		

## 2. 預防用藥疏失--混淆/形音相似藥

### 外觀相近，不同成分/劑量

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p><b>Spiolto Respimat 2.5/2.5 60puffs/Box</b></p>	<p><b>Tiotropium 2.5mcg/puff 60puffs/Bot</b></p>
<p>中文商品名</p>	<p><b>適倍樂 舒沛噴 吸入劑</b></p>	<p><b>適喘樂舒沛噴吸入劑</b></p>
<p>商品名</p>	<p><b>Spiolto Respimat 2.5/2.5 60puffs/Box</b></p>	<p><b>Spiriva Respimat 2.5mcg/puff 60puffs/Bot</b></p>

### 外觀相近，不同成分/劑量

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p><b>Xigduo XR 10/1000mg /Tab(複 方)</b></p>	<p><b>Kombiglyze XR Tab(複方)</b></p>
<p>中文商品名</p>	<p><b>釋多糖持續性藥效膜衣錠</b></p>	<p><b>康併莎持續性藥效膜衣錠</b></p>
<p>商品名</p>	<p><b>Xigduo XR 10/1000mg /Tab</b></p>	<p><b>kombiglyze XR Tab (5mg/1000mg)</b></p>

# 3. 藥物安全警訊

## TFDA 安全警訊摘要與本院現況

### 1. Fingolimod 成分藥品安全資訊

2019/07/26 歐盟 EMA 發布安全資訊，治療多發性硬化症之藥品 Gilenya® (fingolimod) 會對胎兒造成傷害且可能會導致先天性缺陷。因此建議懷孕婦女與具生育能力但未使用有效避孕措施的婦女不得使用 Gilenya®。

1. 上市後報告指出，於懷孕期間使用 fingolimod 的母親所產下的嬰兒發生重大先天性畸形的風險是在一般族群中觀察到的兩倍（根據歐洲以流行病學監測先天性異常的登錄資料(EUROCAT)指出一般族群的比例為 2-3%）。
2. 在母體時曾暴露於 fingolimod 的嬰兒最常被通報的嚴重畸胎為先天性心臟疾病（例如：心房及心室中膈缺損、法洛氏四重症）、腎臟及肌肉骨骼異常。
3. 歐盟 EMA 建議懷孕婦女與具生育能力但未使用有效避孕措施的婦女不得使用 fingolimod。若於使用 fingolimod 時懷孕，必須停藥，且密切監測其妊娠狀況。
4. 為了降低此風險，育齡婦女於開始接受 fingolimod 治療前必須進行妊娠試驗，以確保沒有懷孕，且於治療期間及停藥後 2 個月內必須採取有效的避孕措施。

### 醫療人員應注意事項

1. 須告知育齡婦女 fingolimod 可能具有對胎兒造成傷害的風險。
2. 開始使用 fingolimod 治療育齡婦女前應確認其妊娠試驗結果為陰性。
3. 須告知育齡婦女於使用 fingolimod 期間與停藥後 2 個月內必須採取有效的避孕措施。
4. 須於育齡婦女計畫生育前 2 個月停用 fingolimod。

5. 若病人於使用 fingolimod 期間懷孕，建議立即停藥並告知病人 fingolimod 可能有傷害胎兒的風險。應密切監測其妊娠狀況及進行相關檢查（如：超音波檢查）。

### 本院現況與民眾應注意事項

1. 本院含有 fingolimod 相關成分藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
TFINGOL1	Gilenya	Fingolimod 0.5mg/Cap	捷力能膠囊

2. 育齡婦女於使用 fingolimod 期間必須採用有效的避孕措施。若您正在使用 fingolimod 且計畫生育，請事先諮詢醫師。計畫生育前必須至少停用 fingolimod 2 個月，而於這段期間亦須採取避孕措施。

3. 若您於使用 fingolimod 期間懷孕，請立即通知醫師。醫師將會進一步評估您的用藥並進行額外檢查以監測您的妊娠狀況。

4. 若您對用藥有任何疑問請諮詢專業醫療人員，切勿於諮詢專業醫療人員前自行停藥。