



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路 2 號

電話：(04)22052121-3154

藥劑快訊

本期目次

一、110 年第二次藥委會-新刪藥公告 (P1)

1. 通過常備(共 23 項)(依送審編號排序)
2. 停用品項(共 20 項)(公告用罄後即不再續採購，並以藥庫通知為準)

二、藥品異動資訊 (P6)

1. 新進品項
2. 臨時採購
3. 更換廠牌
4. 包裝異動

三、預防用藥疏失--混淆/形音相似藥 (P14)

1. 外觀相近

四、藥物安全警訊 (P15)

1. TFDA 安全警訊摘要與本院現況
 - (1) Donepezil 藥品安全資訊風險溝通表
 - (2) Hydroxychloroquine 與全身性巨環類抗生素(macrolide antibiotics)藥品併用之安全資訊風險溝通表
 - (3) Alecensa®(alectinib)藥品安全資訊風險溝通表

一、110 年第二次藥委會-新刪藥公告

1. 通過常備(共 23 項)(依送審編號排序)

送審編號	商品名	學名規格	適應症	備註
1-1	Vizimpro	Dacomitinib 30mg/filmcoate tablets	做為單一療法，適用於帶有 EGFR 突變之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）成人病人的第一線治療。	新藥申請
1-2	Vizimpro	Dacomitinib 45mg/filmcoate tablets	做為單一療法，適用於帶有 EGFR 突變之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）成人病人的第一線治療。	新藥申請
申覆 1-1	Lumicef	Brodalumab 210mg/syringe	適合接受全身性治療中至重度斑塊性乾癬成人病人	109Q4 新藥申請
申覆 1-2	Rinvoq	Upadacitinib 15mg/Tab	類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、異位性皮膚炎	109Q4 新藥申請
2-1	Zoladex	Goserelin/10.8mg/Depot,pre-filled syringe	適用於攝護腺癌之治療、適用於停經前婦女之乳癌治療。	新藥申請
2-2	Tresiba FlexTouch	Insulin degludec 300u/3ml	適用於治療一歲以上糖尿病患者，以改善血糖控制。	新藥申請
2-6	Esvatin	Estriol 0.5mg/陰道錠	陰道炎、子宮頸管炎及子宮腔部糜爛。	新藥申請
2-7	HyLink	Cross-linked Hyaluronate 30mg/3ml/syringe	膝部退化性關節炎之疼痛，且經非藥物治療、NSAID 或 Acetaminophen 等一般鎮痛劑，仍治療無效之患者。	新藥申請
申覆 2-1	Hyajoint Plus Synovial Fluid	Sodium Hyaluronate (交鏈型) 20mg/ml, 3ml/Syringe	退化性膝關節炎之玻尿酸關節腔內注射劑	109Q4 新藥申請

送審編號	商品名	學名規格	適應症	備註
	supplement			
3-2	Rocuronium Kabi	Rocuronium Bromide/ <u>100mg/10ml</u> /vial	全身麻醉的輔佐藥，以幫助支氣管內插管，加護病房中須插管及使用人工呼吸器時。	新藥申請(處置內含)
3-6	Methydur 22mg	Methylphenidate 22mg / Cap	注意力不足過動症。	新藥申請
4-1	Bevespi Aerosphere 氣化噴霧劑	Glycopyrronium / Formoterol fumarate dihydrate 7.2/5.0mg/Inhalation	glycopyrronium 和 formoterol 組合藥品，用於阻塞性肺病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)病人氣流阻塞的長期維持治療。	新藥申請
申覆 4-2	Trimbow	Beclometason/Formoterol/Glycopyrronium 100/6/12.5mcg/dose	重度以上呼氣氣流受阻及有惡化病史之 COPD 病人	109Q4 新藥申請
5-1	Fespixon cream	到手香萃取物 PA-F4、積雪草萃取物 S1/1.25%/15g/tube	糖尿病足部傷口潰瘍	新藥申請(自費品項)
5-2	Diquas Ophthalmic solution	Diquafosol Sodium 150mg/5ml/bot	治療乾性角結膜炎病人之角膜以及結膜上皮損傷。	新藥申請(自費品項)
6-6	Torsix	Torseamide 5mg/Tab	治療鬱血性心臟衰竭、腎疾病、肝臟疾病及慢性腎衰竭所引發的水腫症狀，高血壓	新藥申請
申覆 6-1	Ventavis	Iloprost nebuliser sol'n 20mcg/2mL/Amp	原發性肺動脈高血壓	恢復常備品項，限兒童醫院使用
7-1	Cresemba	Isavuconazole 200 mg/乾粉注射劑	1.侵犯性麴菌症 2. 使用於不適合接受 amphotericin B 的病人治療白黴菌病	新藥申請
7-2	Menocik Lyophilized	Minocycline HCl 100mg/vial	革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒等引起之感染症	新藥申請(自費品項)

送審編號	商品名	學名規格	適應症	備註
申覆 7-1	Symtuza	Darunavir 800mg, Cobicistat 150mg, Emtricitabine 200mg, Tenofovir alafenamide 10mg / Film-Coated Tab	抗病毒感染劑	109Q4 新藥申請
申覆 7-2	Zavicefta	Ceftazidime2g, Avibactam 0.5g/Vial	治療3個月以上兒童及成人病人對Zavicefta具感受性的革蘭氏陰性微生物引起的感染	109Q4 新藥申請
9-1	Creon 25000	Pancreatin (Pancreas Powder)300mg/Amylase 18000 Ph.Eur. units ,Lipase 25000 Ph.Eur. units , Protease 1000 Ph.Eur. units	治療兒童及成人因囊狀纖維化症(Cystic Fibrosis, CF)、慢性胰臟炎及胰臟手術等情況所引起的胰液分泌不全。	新藥申請
9-2	Fortacin cutaneous spray	Lidocaine/Prilocaine	治療成年男性之原發性早發性射精	新藥申請(自費品項)


2. 停用品項(共 20 項)(公告用罄後即不再續採購，並以藥庫通知為準)

項次	商品名	學名規格	適應症	備註
1	Giotrif 30mg/Tab	AFaTiNiB 三十 mg/Tab	適用於具有 EGFR TK 突變之局部晚期或轉移性之非小細胞肺癌(NSCLC)患者之第一線治療。	因引進 1-1 及 1-2， 本品不可再臨採供新病人使用
2	Giotrif 40mg/Tab	AFATINIB 40mg/Tab		
3	Leuplin Depot 3M 11.25mg/syringe	Leuprorelin acetate 3M 11.25mg/syringe	一、前列腺癌。二、子宮內膜異位症。三、因子宮肌瘤引起經血過多及貧血預計進行手術切除者。四、停經前乳癌術後輔助療法。五、中樞性早熟。	刪除品項
4	Levemir FlexPen	Insulin detemir 300U/3ml/Pen	治療患有糖尿病的成人、青少年及 1 歲以上兒童	刪除品項
5	HYAFELIC	Sod. Hyaluronate 30mg/3ml/syringe	限用於保守性非藥物治療無效及一般鎮痛劑治療無效之退化性膝關節炎疼痛患者	刪除品項
6	Monovisc	Sod. Hyaluronate 88mg/4ml/Syringe	單次使用之微交聯玻尿酸關節腔注射劑，膝、踝關節退化性關節炎疼痛症狀治療；其作用主要是潤滑	刪除品項
7	Esmeron 50mg/5ml/Vial	Rocuronium Bromide/50mg/5ml/Vial	全身麻醉的輔佐藥，以幫助支氣管內插管，加護病房中須插管及使用人工呼吸器時。	刪除品項
8	Gentamicin eye drop 0.3% 5ml/BT	Gentamicin eye drop 0.3% 5ml/BT	眼部之細菌感染症及對眼部受傷、眼部異物排除後、燒傷或角膜裂傷、化學性或物理性損傷及眼部手術前後之預防感染	刪除品項
9	Licodin	Ticlopidine 100mg/Tab	適用於曾發生完成性栓塞型中風及有中風前兆，且不適用 Aspirin 患者	刪除品項
10	Ziagen	Abacavir 300mg/Tab	抗病毒感染劑	刪除品項
11	Protase E.C	Pancrelipase 280mg/Cap	囊腫性纖維化疾病、慢性胰臟炎、胰臟切除、胃腸繞道手術及因腫瘤引發胰管式膽管阻塞等疾病導致胰液分泌不全	刪除品項


項次	商品名	學名規格	適應症	備註
12	Gliben	Glibenclamide (Glyburide) 5mg/Tab	糖尿病	同藥理類別品項刪除，建議改用 Amaryl 替代
13	GlucMet	Glyburide 5mg+Metformin 500mg/Tab	第二型糖尿病	同藥理類別品項刪除，建議改用 Glimet 2/500 替代
14	Janumet	Sitagliptin 50mg+metformin 850mg/Tab	第二型糖尿病	同藥理類別品項刪除，建議改用其他 DPP-4+Biguanides 複方藥品替代
15	Sulfin	Sulfinpyrazone 100mg/Tab	痛風性關節炎	同藥理類別品項刪除，建議改用其他促尿酸排泄藥品
16	Lasyn F.C	Lacidipine 4mg/Tab	高血壓	同藥理類別品項刪除，建議改用 Amlodipine 、 Nifedipine 、 Felodipine 等其他降壓藥品替代
17	Efient	Prasugrel HCL 3.75mg/Tab	冠狀動脈介入性治療的急性冠狀動脈症候群	同藥理類別品項刪除，建議改用其他抗血小板製劑替代
18	CloPiDogrel (台廠)	CloPiDogrel 75mg/Tab(可諾通)	抗血栓用藥	同藥理類別品項刪除，建議改用 Plavix 75mg/Tab 替代
19	PREZISTA	Darunavir 400 mg/Tab	抗病毒感染劑	同藥理類別品項刪除，建議改用其他抗病毒感染劑
20	Duovir-N	Lamivudine 150 mg + Zidovudine 300mg+Nevirapine 200 mg/Tab	抗病毒感染劑	同藥理類別品項刪除，建議改用其他抗病毒感染劑


二、藥品異動資訊


1. 新進品項


日期	111.03.15	
學名/規格	每劑(0.5mL)含有:A 型肝炎病毒(去活化) 720 ELISA 單位	
商品名	Havrix 720 新赫寶克疫苗	
適應症	A 型肝炎之主動免疫。	

2. 臨時採購

日期	111.03.15	<p style="text-align: center;">此為示意圖</p> 
學名/規格	Tisagenlecleucel 0.2~5.0*10 ⁶ T-cell/Kg	
商品名	Kymriah 祈萊亞靜脈輸注用懸浮液	
適應症	經過基因修飾的自體免疫細胞療法，適用於治療： <ul style="list-style-type: none"> • 患有難治型、移植後復發、第二次或二次以上復發之 B 細胞急性淋巴性白血病 (ALL) 的 25 歲以下兒童和年輕成人病人。 • 經兩線或兩線以上全身治療後之復發性或難治性瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤 (DLBCL) 的成人病人。 	
備註	血腫科臨採藥品	

日期	110.03.15	
學名/規格	Nimodipine 30mg/Tab	
商品名	NIMOTOP 腦妥膜衣錠	
適應症	預防、治療因動脈瘤引起之蜘蛛膜下出血後，腦血管痙攣所引起的缺血性神經缺損。	
備註	神經外科臨採藥品	



日期	110.03.18	
學名/規格	Selpercatinib 80mg/Tab	
商品名	Selpercatinib 80mg/Tab	
適應症	<p>Adult patients with metastatic RET fusion-positive non-small cell lung cancer (NSCLC), Adult and pediatric patients ≥ 12 years old with advanced or metastatic RET-mutant medullary thyroid cancer (MTC) who require systemic therapy¹, Adult and pediatric patients 12 years of age and older with advanced or metastatic RET fusion-positive thyroid cancer who require systemic therapy and who are radioactive iodine-refractory (if radioactive iodine is appropriate.</p>	
備註	胸腔科臨採藥品	



日期	110.03.30	
學名/規格	Insulin degludec	
商品名	Tresiba FlexTouch 諾胰保諾特筆	
適應症	適用於治療一歲以上糖尿病患者，以改善血糖控制	
備註	小兒遺傳科臨採	

日期	110.03.31	
學名/規格	Amivantamab 350mg/7mL/Vial	
商品名	Amivantamab 350mg/7mL/Vial	
適應症	單一療法適用於罹患帶有表皮生長因子受體(EGFR) exon 20 插入突變之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC) 的成人病人，作為含鉑類化學療法治療失敗後之治療。	
備註	胸腔科臨採藥品	

日期	110.03.31	
學名/規格	Human Immunoglobulin proteins	
商品名	Gamunex-C 10g/100mL/vial	
適應症	原發性體液性免疫不全症、原發性血小板缺乏紫斑症、慢性脫髓鞘多發性神經炎。	
備註	心臟血管外科臨採藥品	

3. 更換廠牌


日期	111.03.22	變更項目	由嬌生變更為生達廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Each tab contains: Tramadol 37.5 mg + Acetaminophen 325 mg		
商品名	Ultracet 及通安錠	Ultraphen 立除痛膜衣錠	
適應症	使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。		
備註	原廠停產，進用取代。		

日期	111.03.31	變更項目	由永豐廠變為信東廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Sodium chloride 0.9% 500 mL/Bot		
商品名	SODIUM CHLORIDE INJECTION "Y.F." "永豐"生理食鹽水注射液	Isotonic sodium chloride solution 生理食鹽水注射液	
適應症	水份補給。		
備註	原永豐廠缺貨，進用暫代。		


4. 包裝異動


日期	111.03.29	變更項目	外盒包裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Dorzolamide Oph. Solution 2% 5mL/Bot		
商品名	Trusopt Oph. Solution 2% 舒露瞳點眼液劑		
適應症	高眼壓症、廣角性青光眼。		

日期	111.03.29	變更項目	外盒包裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Each ml contains: 10mg brinzolamide and 2mg brimonidine tartrate.		
商品名	Simbrinza eye drop 勝克壓複方點眼液		
適應症	用於治療曾使用單方治療效果不佳的隅角開放性青光眼或高眼壓成人患者，以降低其眼內壓。		

日期	111.03.29	變更項目	新增鋁箔貼紙
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Pramipexole 1.5 mg/ prolonged-release Tab		
商品名	Mirapex 1.5mg prolonged-release tablets 樂伯克持續性藥效錠		
適應症	治療巴金森氏症的徵候及症狀		



日期	111.03.29	變更項目	鋁箔大小變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Prednisolone 5mg/Tab		
商品名	Donison 樂爾爽錠		
適應症	癩麻質斯性疾病、異常反應性疾病、皮膚病		

日期	111.04.06	變更項目	外盒變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Abraxane(Paclitaxel) 100mg/20mL/Vial		
商品名	Abraxane(Paclitaxel) 100mg/20mL/Vial		
適應症	轉移性乳癌、非小細胞肺癌、胰腺癌。		

日期	111.04.07	變更項目	鋁箔印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Calcitriol 0.5 mcg/Cap		
商品名	U-Ca 活維D軟膠囊		
適應症	佝僂症、軟骨病、促進鈣磷吸收、維他命D缺乏症、過敏性疾患。		

三、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 外觀相近

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p>Bethanechol 25mg/Tab</p>	<p>Hydralazine(錠劑) 25mg/Tab</p>
<p>中文商品名</p>	<p>胃可麗錠 25 毫克</p>	<p>哈伯寧錠</p>
<p>商品名</p>	<p>Wecoli 25mg/Tab</p>	<p>Apolin 25mg/Tab</p>

四、藥物安全警訊

TFDA 安全警訊摘要與本院現況

(1) Donepezil 藥品安全資訊風險溝通表

2022/2/28 澳洲藥品管理局 (Therapeutic Goods Administration, TGA) 發布含 donepezil 成分藥品可能具有 QT 區間延長風險致嚴重心臟傳導問題之安全警訊。

- i. 用於治療阿滋海默症之含 donepezil 成分藥品，可影響心臟傳導系統之作用，因此可能具有潛在 QT 區間延長之風險。
- ii. 截至 2022/1/5 止，TGA 已接獲 18 例疑似使用含 donepezil 成分藥品後發生心臟傳導不良反應之通報案例，包含房室傳導阻滯 (atrioventricular block)、完全房室傳導阻滯 (atrioventricular block complete)、第二級房室傳導阻滯 (atrioventricular block second degree)、束支傳導阻滯 (bundle branch block)、雙分支阻滯 (bifascicular block)、及多型性心室心搏過速 (Torsades de Pointes) 等。
- iii. TGA 已更新 donepezil 之藥品仿單及用藥須知，包含具有下列情形者於用藥期間應謹慎使用之警語：
 - 具有 QT 區間延長病史
 - 具有 QT 區間延長之家族史
 - 正在服用其他亦會導致 QT 區間延長之藥品
 - 具有心臟相關疾病如心衰竭、近期心臟病發作或緩脈性心律不整
 - 電解質不平衡 (低血鉀、低血鎂等)

醫療人員應注意事項：

- i. 開立處方含 donepezil 成分藥品予病人前，應評估其臨床效益與風險，並盡可能取得病人的心臟相關病史或家族史，及目前用藥情形。用藥期間應留意病人電解質變化及相關藥品交互作用。
- ii. 因含 donepezil 成分藥品可能具有潛在 QT 區間延長之風險，如需開立含 donepezil 成分藥品於正在服用下列或其他已知可能具有 QT 區間延長風險藥品之病人，應審慎評估其臨床效益及風險。
 - 抗心律不整藥品 class IA：如 disopyramide 等。
 - 抗心律不整藥品 class III：如 amiodarone、sotalol 等。

- 部分抗憂鬱劑：如 citalopram、escitalopram、amitriptyline 等。
- 部分抗精神疾患藥品：如 chlorpromazine、prochlorperazine, pimozide、ziprasidone 等。
- 部分抗生素：如 clarithromycin、erythromycin、moxifloxacin 等。

本院現況與民眾應注意事項：

i. 本院含 Donepezil 成分之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
TDONEP11	Aricept	Donepezil 口崩錠 10mg/Tab	愛憶欣口崩錠
TDONEP10	Aricept	Donepezil 10mg/Tab	愛憶欣膜衣錠
TDONEPE	Aricept	Donepezil 5mg/Tab	愛憶欣膜衣錠

ii. 若家中有正在使用、或將要使用含 donepezil 成分藥品者，請主動告知醫師，其是否具有心臟相關病史或家族史，如具有 QT 區間延長、心律不整、或低血鉀或低血鎂等，及用藥史，包含是否正在服用下列藥品：

- 部分心律不整藥品：如 disopyramide、amiodarone、sotalol 等。
- 部分憂鬱症藥品：如 citalopram、escitalopram、amitriptyline 等。
- 部分精神疾患藥品：如 chlorpromazine、prochlorperazine、pimozide、ziprasidone 等。
- 部分抗生素：如 clarithromycin、erythromycin、moxifloxacin 等

iii. 用藥期間若有任何身體不適，請盡速尋求醫療協助，勿自行停藥。對於用藥有任何疑問或疑慮請諮詢醫療人員。

(2) Hydroxychloroquine 與全身性巨環類抗生素(macrolide antibiotics) 藥品併用之安全資訊風險溝通表

2022/2/15 英國醫藥品管理局(MHRA)針對 hydroxychloroquine 或 chloroquine 與全身性 macrolide antibiotics 類併用，可能導致心血管事件及死亡風險增加，同時提醒 hydroxychloroquine 或 chloroquine 可能導致憂鬱、焦慮、幻覺及思覺失調等已知相關精神疾病發布安全警訊。

- 2020 年 8 月發表的一項觀察性回顧型研究結果顯示，短期（30 天內）併用 hydroxychloroquine 與 azithromycin 治療者，相較於 hydroxychloroquine 併用 amoxicillin，有增加狹心症、胸痛、心衰竭及心血管死亡風險。研究中認為

- 可能的原因為 hydroxychloroquine 及 azithromycin 併用對於 QT 區間延長之累積效應（協同作用），增加心律不整及心因性死亡，或因其他加成之心臟毒性效應。
- ii. MHRA 經評估後建議修訂 hydroxychloroquine 成分藥品與全身性使用之 azithromycin 藥品仿單以加刊上述風險之警語；而 chloroquine，及 clarithromycin 與 erythromycin 等 macrolide antibiotics 類藥品可能有相似之安全性特性，故建議 chloroquine 與其它全身性 macrolide antibiotics 類等藥品仿單亦應加刊相關安全資訊。
 - iii. 另，已知 hydroxychloroquine 及 chloroquine 成分藥品與發生精神疾病具相關聯，包含憂鬱、焦慮、幻覺及思覺失調等。2020 年 11 月一項歐洲安全性回顧曾建議更新 hydroxychloroquine 及 chloroquine 成分藥品仿單之警語，除應涵蓋各式的精神疾病症狀外還需包含罕見的自殺行為。評估指出精神疾病症狀通常發生於開始治療的第一個月內，亦曾發生於無精神相關疾病史的病人。

醫療人員應注意事項：

- i. 醫師開立處方含全身性 macrolide antibiotics 類藥品予正使用含 hydroxychloroquine 成分藥品的病人前，應謹慎評估病人之臨床效益與風險。
- ii. 若臨床上有必要併用含 hydroxychloroquine 成分藥品與全身性 macrolide antibiotics 類藥品時，應謹慎用於具有心血管事件風險的病人，並遵循每項中文仿單之建議。
- iii. 應對含 hydroxychloroquine 成分藥品有關的精神疾病反應保持警覺，曾有案例發生於無精神相關病史的病人。

本院現況與民眾應注意事項：

- i. 本院含 Hydroxychloroquine 與全身性巨環類抗生素(macrolide antibiotics)成分之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
THYD-CH1	Plaquenil	Hydroxychloroquine 200mg/Tab	必賴克慶膜衣錠
TAZITHR	Zithromax	Azithromycin 250mg/Tab	日舒膜衣錠
LAZITHR	Zithromax	Azithromycin 40mg/mL 15mL/Bot	日舒懸液用粉
TCLARI5	Klaricid	Clarithromycin F.C.500mg/Tab	開羅理黴素膜衣錠
ICLARI5	Klaricid	Clarithromycin IV 500mg/Vial	開羅理黴素靜脈注射劑
TERYTH2	Erythromycin	Erythromycin 250mg/Cap	紅黴素膠囊
IERYTHR	Erythrocin	Erythromycin lactobionate 500mg/Vial	威黴素靜脈注射液

- ii. 含 hydroxychloroquine 成分藥品與口服或針劑型的 macrolide antibiotics 類藥品併用時，可能增加發生心臟不良反應的風險。
- iii. 若於用藥期間有任何心臟相關症狀（如心悸、昏厥、胸痛或無法解釋的呼吸困難），應立即就醫。
- iv. 曾有一些病人在開始使用含 hydroxychloroquine 成分藥品治療後出現心理健康相關的症狀。若病人或家人、照顧者發現使用 hydroxychloroquine 後發生任何新的或惡化的心理健康症狀，請立即尋求醫療協助。
- v. 用藥期間若有任何身體不適，請盡速尋求醫療協助，勿自行停藥。對於用藥有任何疑問或疑慮請諮詢醫療人員。

(3) Alecensa®(alectinib)藥品安全資訊風險溝通表

2022/2/15 瑞士醫藥管理局（Swissmedic）發布轉知 Alecensa®（alectinib）許可證持有商針對 alectinib 造成溶血性貧血提出警告及預防措施，並已於仿單中建議藉由調整劑量以改善發生溶血性貧血之風險。

- i. 在 Alecensa®（alectinib）臨床試驗中曾有溶血性貧血的案例被通報，而上市後使用經驗中亦曾接獲相關案例，故溶血性貧血被認為是 alectinib 的風險之一。
- ii. 近期針對溶血性貧血案例的一份累計性資料分析結果顯示，多數通報的溶血性貧血事件結果可透過調整使用劑量獲得改善。
- iii. 若血紅素濃度 < 10 g/dL 並且懷疑溶血性貧血則應中斷 alectinib 治療，且開始適當的實驗室檢查。
- iv. 若確診溶血性貧血，應中斷 alectinib 治療，直到症狀消退並以較低劑量恢復治療或是永久停藥。另劑量調整的建議已刊載於仿單中之用法用量處。

醫療人員應注意事項：

- i. Alecensa®（alectinib）於臨床試驗和上市後使用經驗中皆曾有溶血性貧血的案例被通報。
- ii. 溶血性貧血為具臨床重要性之不良反應，並且可透過調整適當劑量來降低風險。
- iii. 若病人的血紅素值低於 10 g/dL 且懷疑可能是溶血性貧血時，應停用 alectinib 並進行實驗室檢驗；若經確認為溶血性貧血，該藥品應停用至病人恢復，並以較低劑量重啟治療或永久停藥。

- iv. 應告知病人該藥品具溶血性貧血風險，並指導病人若出現不明原因的頭暈、疲倦、虛弱、臉色蒼白、易喘、呼吸困難、發燒、黃疸、深色尿液等症狀，應立即回診尋求醫療協助。

本院現況與民眾應注意事項：

- i. 本院含 Alectinib 成分之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
TALECTI	Alecensa	Alectinib 150mg/Cap	安立適膠囊 150 毫克

- ii. Alecensa® (alectinib) 於臨床試驗和上市後使用經驗中皆曾有溶血性貧血的案例被通報。
- iii. 若您於使用該藥品後出現任何可能為溶血性貧血之相關徵候或症狀，例如頭暈、疲倦、虛弱、臉色蒼白、易喘、呼吸困難、發燒、黃疸、深色尿液等，請立即回診尋求醫療協助。
- iv. 若您對用藥有任何疑問或疑慮，請諮詢醫療人員，切勿自行停用藥物。