



蜂窩組織炎

蜂窩組織炎是真皮及皮下組織被微生物感染的一種皮膚疾病。常見於下肢有破皮或開放性傷口時，病原菌由此入口經局部或淋巴系統散播，而造成局部的組織發炎。

臨床症狀

局部呈現紅、腫、熱和腫痛，若不及時治療，感染部位可能會逐漸化膿和壞死，也可能引起發燒和白血球增加等全身性的症候，嚴重者可致患肢壞疽、敗血症。

醫療處置

主要為經驗性抗生素治療以控制感染，在給藥前建議作血液培養或患處局部分泌物的培養。依傷口的變化及培養結果，可再調整藥物做更精確的治療。經適當治療後約 1 ~ 3 天後症狀會改善，而 7 ~ 14 天後大部分的病人可以痊癒。

護理原則

- 患肢必須休息和抬高，以促進血液回流及減輕水腫。
- 密切觀察患部皮膚之紅腫、溫度及疼痛情形之改變。
- 開放性傷口，傷口護理必須採用外科無菌技術，更換後之敷料則需以有感染標誌之可燃性塑膠袋包裝後焚燒。
- 患部之疼痛可依醫囑給予止痛藥。
- 多臥床休息。

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡
電話：(04) 22052121 分機 1931
HE-10010