



鉛中毒檢驗

- 鉛的暴露，可能來自油漆色料或塗料、釉藥的製造使用、鉛蓄電池的製造與回收、塑膠品或塑膠安定劑的製造、錫鉛熔鑄、電線電纜、映像管與日光燈製造、電子焊錫與電容器噴錫等作業、以及空氣污染。
- 如果工作中會接觸到鉛，下班時，應在工廠洗澡及換好衣服再回家，並把自己的衣服與家人的衣服分開清洗，避免讓小孩暴露在鉛汙染的環境中。
- 小孩玩具則宜選用合格產品，並禁止小孩將塑膠玩具放在嘴裡咬。
- 不要讓小孩吸到二手菸，菸品可能帶來鉛和鎘的汙染。另外，不要用水晶杯來盛裝酸性飲料，避免鉛的溶出。
- 鉛中毒會引發貧血、神經肌肉麻痺、兒童鉛腦症或智力較差、腎臟損傷及腹痛等消化道症狀。

檢驗表單	重金屬檢驗單(CM-L502)	
檢驗項目	血中鉛	尿中籤
參考範圍	< 10 $\mu\text{g}/\text{dl}$	< 50 $\mu\text{g}/\text{dl}$
採檢容器 及 檢體量	 Li-Heparin tube 最低採檢量 4 ml	 S-Y urine Tube 最低採檢量 5 ml
採檢注意事項	1. 避免凝血與溶血	請緊閉蓋子，避免外漏汙染。

	2. EDTA管亦接受，其他一律退件 3. 請勿於含有鉛環境中抽血
檢驗方法	Atomic Absorption Spectrometry
可送檢時間	星期一 ~ 星期五 08 : 00 ~ 17 : 00 (例假日休)
報告完成時間	不含例假日，14個工作天
院內分機	(04) 22052121 轉 7613

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡
電話：(04) 22052121 分機 7613