





鉻中毒

六價鉻有劇毒及腐蝕性。急性中毒會造成皮膚鉻潰瘍 Chrome ulcer、鼻中膈穿孔、吸入過敏性接觸皮膚炎、胃腸出血性胃腸炎（食入 1 ~2 公克會致命）、急性腎衰竭或肺水腫。長期六價鉻暴露可能引起氣喘、塵肺症、癌症（肺癌）。

檢驗表單	重金屬檢驗單(CM-L502)	
檢驗項目	血中鉻	尿中鉻
參考範圍	< 26.5 $\mu\text{g}/\text{dl}$	< 40 $\mu\text{g}/\text{dl}$
採檢容器 及 檢體量	 Li-Heparin tube 最低採檢量 4 ml	 S-Y urine Tube 最低採檢量 5 ml
採檢注意事項	避免凝血與溶血	1.請緊閉蓋子，避免外漏汙染。 2.請確實將總尿量註明於檢驗單申請單上
檢驗方法	Atomic Absorption Spectrometry	

可送檢時間	星期一 ~ 星期五 08 : 00 ~ 17 : 00 (例假日休)
報告完成時間	不含例假日 · 14個工作天
院內分機	(04) 2202121 轉 7613

若有任何疑問 · 請不吝與我們聯絡
電話 : (04) 22052121 分機 7613
HE-17013