




## 鎘中毒

- 食入性鎘急性中毒會有噁心、腹痛、嘔吐、出血性腸胃炎、肝、腎壞死、心臟擴大等症狀。食入慢性性中毒則會導致腎病變包括：低分子量蛋白尿、胺基酸尿及糖尿、以及痛痛病、高血壓、心臟血管疾病、及癌症。
- 吸入性鎘（氧化鎘）急性中毒會引起嚴重的金屬燻煙熱（Metal fume fever）。在暴露後 12 ~ 24 小時後，發生胸痛、頭痛、咳嗽、呼吸困難、發燒、肺水腫、腎肝壞死。慢性性中毒則會導致肺纖維化及腎病變。

檢驗表單	重金屬檢驗單(CM-L502)
檢驗項目	血中鎘 ( Blood-cadmium ; Cd )
參考範圍	吸菸者 1.4-4.0 $\mu\text{g}/\text{dl}$ , 不吸菸者 0.4-1.0 $\mu\text{g}/\text{dl}$
採檢容器 及 檢體量	 Li-Heparin tube, 最低採檢量 4ml
採檢注意事項	避免凝血與溶血
檢驗方法	Atomic Absorption Spectrometry
可送檢時間	星期一 ~ 星期五 08 : 00 ~ 17 : 00 ( 例假日休 )

報告完成時間	不含例假日，14個工作天
院內分機	(04) 2202121 轉 7613

---

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡  
電話：(04) 22052121 分機 7613  
HE-17017