



電燒手術

『電燒』是一種婦產科在治療疾病的手術名稱，以下介紹手術的適應症及手術前後注意事項。

適應症

包括尖形濕疣（俗稱菜花）、子宮頸管瘻肉、子宮頸糜爛等等。

注意事項

手術前：

- 通常不需禁食【但視病灶範圍再遵照醫囑指示給與局部麻醉或其它麻醉方式，若為全身麻醉則需禁食】。
- 填寫手術及麻醉同意書。

手術中：

- 通常為局部麻醉（必要時全身麻醉，如：陰道狹窄或情緒緊張）。
- 電燒時會聞到煙味，是因在電燒組織時所產生碳化反應，勿緊張。

手術後

- 術後 1 ~ 2 天有輕微出血及疼痛情形。但少數會發生遲發性出血。
 - 保持患部的乾燥、清潔。
 - 患部的結痂會在 2 ~ 3 天後自然脫落。
 - 在 4 ~ 6 週之內水性分泌物會增加。
 - 勿行使陰道沖洗，性交或置陰道棉條須等 1 個月後或等分泌物完全乾淨後再進行之。
 - 按時服用口服藥及患部塗抹藥膏，必要時可在術後 2 ~ 3 天內坐浴 15 分鐘，以減輕患部腫脹疼痛。
 - 4 週後門診追蹤複檢。
-

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡
電話：(04) 22052121 分機 4145