



中國醫藥大學附設醫院  
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地 址：台中市育德路 2 號

電 話：(04)22052121-3154

# 藥 劑 快 訊

## 本期目次

### 1. 藥品異動資訊 (P1)

- (1) 新進品項
- (2) 臨時採購
- (3) 更換廠牌
- (4) 包裝異動

### 2. 預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P6)


- (1) 同廠牌，不同成分/劑量
- (2) 不同廠牌，外觀相似

### 3. 藥物安全警訊 (P7)


- (1) Acetaminophen 成分藥品安全資訊
- (2) 本院相關藥品清單/注意事項

# 1. 藥品異動資訊



## (1) 新進品項

日期	107.04.30	
學名/規格	Lurasidone HCL 40mg/Tab	
商品名	Latuda 樂途達錠	
適應症	1. 思覺失調症 LATUDA 用於治療成人和青少年(13 至 17 歲)的思覺失調症。2. 第一型雙極性疾患之鬱症發作	
常用劑量	起始劑量為每日40毫克，一天一次。起始劑量不需調整 (titration)。劑量範圍:每日40毫克至160毫克。建議最大劑量為每日160毫克。	
備註	105 年第四次藥委會進用新藥	

**(2) 臨時採購**



日期	107.04.24	
學名/規格	Mesalazine GASTRO-resistant 800mg/Tab	
商品名	ASACOL 阿腸克錠	
適應症	治療潰瘍性結腸炎及其持續治療以防止復發	
備註	外科部大腸直腸外科臨採	
易混淆品項	<b>Mesalazine 500 mg/Tab 頗得斯安持續錠</b> <b>Mesalazine 1000mg/supp 頗得斯安栓劑</b>	



### (3) 更換廠牌

日期	107.04.16	變更項目	由健喬信元廠換為優良廠
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Verapamil(針劑) 5mg/2mL/Amp		
商品名	U-sodin 優賜定注射液		
適應症	陣發性上室性心搏過速、對於心房撲動、心房纖維顫動情況時、快速心室心搏之暫時性控制		
備註	因原製造廠暫停生產，進用替代		
易混淆品項	Isomil S.C. 40mg/Tab 依索蜜糖衣錠		

**(4) 包裝異動**


日期	107.04.16	變更項目	增加紙盒包裝
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Cyanocobalamin (VIT B12) 0.02% 5mL/Bot		
商品名	散克巴點眼液		
適應症	眼睛疲勞		

日期	107.04.25	變更項目	膠囊顏色改變
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Dabigatran 110mg/Cap		
商品名	普栓達膠囊		
適應症	預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風與全身性栓塞。		
易混淆品項	Pradaxa 150mg/Cap 普栓達膠囊 150 毫克 Pradaxa 75mg/Cap 普栓達膠囊 75 毫克		


日期	107.04.26	變更項目	外包装及膠囊外觀改變
新舊對照	舊		新
圖片			
學名規格	Fluconazole 50 mg/Cap		
商品名	Diflucan 泰復肯膠囊		
適應症	念珠球菌局部或全身感染、囊珠菌感染、預防後天免疫缺乏症候群病人的黴菌感染		

## 2. 預防用藥疏失--混淆/形音相似藥品

### 同廠牌，不同成分/劑量

<p>圖片(範例)</p>		
<p>學名規格</p>	<p>Akurit-4 150/75/400/275mg/Tab</p>	<p>Akurit-3 150/75/275mg/Tab</p>
<p>中文商品名</p>	<p>立剋核-4 膜衣錠</p>	<p>立剋核膜衣錠</p>
<p>商品名</p>	<p>Akurit-4</p>	<p>Akurit-3</p>

### 不同廠牌，外觀相似

<p>圖片(範例)</p>		
<p>學名規格</p>	<p>Nevirapine XR 400 mg/Tab</p>	<p>Trajenta duo 2.5/850 mg/Tab</p>
<p>中文商品名</p>	<p>衛滋持續性藥效錠</p>	<p>糖倍平膜衣錠</p>
<p>商品名</p>	<p>VIRAMUNE XR</p>	<p>Trajenta duo</p>



# 3. 藥物安全警訊

## TFDA 安全警訊摘要與本院現況

### 1. Acetaminophen 成分藥品安全資訊

2018/02/19 歐盟 EMA 發布，由於目前尚無適當之治療方法來處理含 acetaminophen ( paracetamol ) 成分緩釋劑型藥品過量之情況，將暫停該類藥品販售許可。

1. 歐盟 EMA 評估後認為，含 acetaminophen ( paracetamol ) 成分緩釋劑型藥品之藥物動力學與速效劑型 ( immediate-release ) 不同，目前治療速效劑型過量之方法並不適用於治療緩釋劑型過量，且許多 acetaminophen 過量的案例，並無法判斷導致過量之劑型。
2. 因目前尚未能有效管控含 acetaminophen ( paracetamol ) 成分緩釋劑型藥品過量之風險，EMA 將暫停該類藥品之販售許可，直到藥商提出可有效降低該類藥品過量風險之管控措施。
3. 另含 acetaminophen ( paracetamol ) 成分速效劑型藥品並未受此次決議影響，仍可繼續使用。

### 本院相關藥品清單/注意事項

1. 本院現無同類成分之藥品
2. 醫療人員應注意事項：
  - (1) 醫師處方或藥師交付含 acetaminophen 成分藥品時，應提醒病人應遵照醫囑使用，且應避免併服含酒精性飲料，並詢問病人是否有使用其他可能含該成分之藥品，以避免病人因重複用藥或劑量過高而發生肝損傷之情形。
  - (2) Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死，亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後 48 至 72 小時才明顯可見。