



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路 2 號

電話：(04)22052121-3154

藥劑快訊

本期目次

一、藥品異動資訊 (P1)


1. 臨時採購
2. 更換廠牌
3. 包裝異動


二、預防用藥疏失--混淆/形音相似藥 (P7)


1. 外觀相近


一、藥品異動資訊

1. 臨時採購

| | | |
|-------|--|--|
| 日期 | 110.02.23 |  <p>The image shows the packaging for Delstrigo. On the left is a box with the text: 'PRESCRIPTION ONLY MEDICINE KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN', 'Delstrigo', '100mg/300mg/300mg film-coated tablet', 'Doravirine/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate', 'For oral use only', and '30 film-coated tablets'. On the right is a white plastic bottle with a red label that says '達滋克', '100mg/300mg/300mg', and '30 film-coated tablets'. Above the bottle, two white, oval-shaped film-coated tablets are shown on a ruler for scale.</p> |
| 學名/規格 | Doravirine 100mg, Lamivudine 300mg, and Tenofovir disoproxil fumarate 300mg/ tab | |
| 商品名 | Delstrigo Tab 達滋克膜衣錠 | |
| 適應症 | DELSTRIGO 為一完整治療配方，適用於治療下列感染第一型人類免疫缺乏病毒 (HIV-1) 的成年病人：(1)未接受過抗反轉錄病毒療法。(2)正穩定接受抗反轉錄病毒療法、已達病毒學抑制狀態 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL)、未有治療失敗病史，且不具已知與 DELSTRIGO 中任一各別成分抗藥性相關的突變。 | |
| 備註 | 感染科臨採藥品 | |



| | | |
|-------|--|---|
| 日期 | 110.02.24 |  <p>The image shows three glass vials of TheraCIM. Two are standing upright, and one is lying on its side next to a ruler for scale. The vials have blue labels with the text: 'TheraCIM', '50 mg in 10 mL', and 'INN: GENE'. The vials are clear and contain a colorless liquid.</p> |
| 學名/規格 | Nimotuzumab 50mg/ Vial | |
| 商品名 | TheraCIM | |
| 適應症 | Nasopharyngeal and head and neck cancer; relapsed high-grade glioma in children and adolescents. | |
| 備註 | 血液腫瘤科臨採藥品 | |

| | | |
|-------|----------------------------------|--|
| 日期 | 110.02.24 |  |
| 學名/規格 | Copanlisib 60mg/Vial | |
| 商品名 | Aliqopa 安列庫帕凍晶靜脈注射劑 | |
| 適應症 | 治療曾接受至少兩次全身性治療的復發性濾泡淋巴瘤(FL)成人病人。 | |
| 備註 | 血液腫瘤科臨採藥品 | |



| | | |
|-------|---|---|
| 日期 | 110.03.08 |  |
| 學名/規格 | Damoctocog alfa pegol 500 IU/2.5 ML/Vial | |
| 商品名 | Jivi 500 IU/Vial 傑威長效第八因子注射劑 | |
| 適應症 | 用於 12 歲(含)以上曾接受治療的 A 型血友病病人的下列狀況： — 治療及控制出血事件。 — 手術前中後之出血處置。 — 作為例行預防，以降低病人之出血事件發生率。 | |
| 備註 | 小兒血液腫瘤科臨採藥品 | |



| | | |
|-------|---|--|
| 日期 | 110.03.08 |  |
| 學名/規格 | Damoctocog alfa pegol 1000 IU/2.5 ML/Vial | |
| 商品名 | Jivi 1000 IU/Vial 傑威長效第八因子注射劑 | |
| 適應症 | 用於 12 歲(含)以上曾接受治療的 A 型血友病病人的下列狀況： — 治療及控制出血事件。 — 手術前中後之出血處置。 — 作為例行預防，以降低病人之出血事件發生率。 | |
| 備註 | 小兒血液腫瘤科臨採藥品 | |

2. 更換廠牌

| | | | |
|-------|---|--|--------------|
| 日期 | 110.02.01 | 變更項目 | 由景德廠轉為健喬信元廠廠 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | DoxaZosin 2mg/Tab | | |
| 商品名 | Kinxaben tablets 心血平錠 | Doxter tablets 立安錠 2 毫克 | |
| 適應症 | 高血壓、良性前列腺肥大。 | | |
| 備註 | 取代原 KinXaben。 | | |

3. 包裝異動

| | | | |
|-------|---|---|--------|
| 日期 | 110.02.25 | 變更項目 | 片裝印刷變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Pramipexole 0.25 mg/Tab | | |
| 商品名 | Mirapex 樂伯克錠 | | |
| 適應症 | 治療自發性巴金森氏症的徵候及症狀、治療原發性腿部躁動症 (PRIMARY RESTLESS LEGS SYNDROME) 的症狀。 | | |

| | | | |
|-------|---|--|------|
| 日期 | 110.02.25 | 變更項目 | 外盒變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  |  | |
| 學名/規格 | Granisetron 1mg/Tab | | |
| 商品名 | Setron F.C. Tablets 賜安特膜衣錠 | | |
| 適應症 | 預防及治療抗腫瘤化學療法與抗腫瘤放射線療法引起的噁心、嘔吐。 | | |

| | | | |
|-------|--|------|--|
| 日期 | 110.03.10 | 變更項目 | 片裝大小變更 |
| 對照 | 舊 | 新 | |
| 圖片 |  | |  |
| 學名/規格 | Tofacitinib 5mg/Tab | | |
| 商品名 | XELJANZ Film-Coated Tablets 捷抑炎膜衣錠 | | |
| 適應症 | <p>1. 類風濕性關節炎：XELJANZ 適用於治療患有中至重度活動性類風濕性關節炎且對 methotrexate 無法產生適當治療反應或無法耐受 methotrexate 之成人病人。本品可用於單一療法或與 methotrexate 或其他非生物性的疾病緩解型抗風濕藥物 (DMARDs) 合併使用。使用限制：不建議 XELJANZ 與生物性的疾病緩解型抗風濕藥物 (DMARDs)，或與強效免疫抑制劑 (如 azathioprine 與 cyclosporine) 合併使用。</p> <p>2. 乾癬性關節炎：XELJANZ 與非生物性的疾病緩解型抗風濕藥物 (DMARDs) 合併使用，適用於治療患有活動性乾癬性關節炎且對 methotrexate 或其他疾病緩解型抗風濕性藥物 (DMARDs) 無法產生適當治療反應或無法耐受之成人病人。使用限制：不建議 XELJANZ 與生物性的疾病緩解型抗風濕藥物 (DMARDs)，或與強效免疫抑制劑 (如 azathioprine 與 cyclosporine) 合併使用。</p> <p>3. 潰瘍性結腸炎：XELJANZ 適用於治療對類固醇、azathioprine、6-mercaptopurine (6-MP) 或 TNF 抑制劑療法失敗或無法耐受之中度至重度活動性潰瘍性結腸炎成人病人。使用限制：不建議 XELJANZ 與治療潰瘍性結腸炎之生物性療法或與強效免疫抑制劑 (如 azathioprine 與 cyclosporine) 合併使用。</p> | | |

二、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 相同成分，不同劑量。

| | | |
|--------------|---|--|
| <p>圖片</p> | <p>NOVARTIS 卓定康 Certican 0.25毫克錠 Everolimus 322740 TW 衛署藥輸字第 024770 號</p> | <p>NOVARTIS 卓定康 Certican 0.5毫克錠 Everolimus 322730 TW 衛署藥輸字第 024772 號</p> |
| <p>學名規格</p> | <p>EvErOliMus 0.25mg/Tab</p> | <p>everolimus 0.5mg/Tab</p> |
| <p>中文商品名</p> | <p>[藍]卓定康錠</p> | <p>[紅]卓定康錠</p> |
| <p>商品名</p> | <p>Certican 0.25mg/Tab</p> | <p>certican 0.5mg/Tab</p> |

| | | |
|--------------|---|--|
| <p>圖片</p> | <p>NOVARTIS 愛服妥錠 2.5毫克 VOTUBIA® 2.5 mg everolimus 衛署藥輸字第 024770 號</p> | <p>324010 TW NOVARTIS 癌伏妥錠 5毫克 Afinitor® 5 mg everolimus 衛署藥輸字第 024772 號</p> |
| <p>學名規格</p> | <p>Everolimus 2.5mg/Tab</p> | <p>Everolimus 5mg/Tab</p> |
| <p>中文商品名</p> | <p>愛服妥錠</p> | <p>癌伏妥</p> |
| <p>商品名</p> | <p>VOTUBIA 2.5mg/Tab</p> | <p>Afinitor 5mg/Tab</p> |