



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路 2 號

電話：(04)22052121-3154

藥劑快訊

本期目次

一、藥品異動資訊 (P1)

1. 臨時採購
2. 包裝異動

二、預防用藥疏失--混淆/形音相似藥 (P6)

1. 外觀相近


三、藥物安全警訊 (P7)


1. TFDA 安全警訊摘要與本院現況

- (1) Phytomenadione 成分藥品安全資訊風險溝通表



一、藥品異動資訊



1. 臨時採購



日期	110.10.15	
學名/規格	Liraglutide 6mg/mL 3mL/Pen	
商品名	Saxenda 善纖達	
適應症	<p>用於體重控制，做為低熱量飲食及增加體能活動外之輔助療法，適用對象為成人病人且初始身體質量指數 (BMI) 為 $\geq 30 \text{ kg/m}^2$，或 $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ 至 $< 30 \text{ kg/m}^2$，且病人至少有一項體重相關共病，例如第二型糖尿病、高血壓或血脂異常。以每天 3.0 mg 治療 12 週後，若病人初始體重並未減輕至少 5%，應停止善纖達治療。</p>	



日期	110.10.19	
學名/規格	Each tab contains: sofosbuvir 400mg, velpatasvir 100mg, voxilaprevir 100mg.	
商品名	Vosevi 沃士維膜衣錠	
適應症	<p>未併有肝硬化或併有代償性肝硬化(Child-Pugh A 級)的成人慢性 C 型肝炎病毒(HCV)感染症，並且符合以下任一條件： 1.基因型 1、2、3、4、5 或 6,且曾經接受含 NS5A 抑制劑之 HCV 療程。 2.基因型 1a 或 3，且曾經接受含 sofosbuvir 但無 NS5A 抑制劑之 HCV 療程。</p>	



2. 包裝異動

日期	110.10.14	變更項目	外盒印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	MPG-Epoetin beta 100mcg/0.3mL/Syringe		
商品名	Mircera 美血樂針筒裝注射劑		
適應症	治療慢性腎病所引起的症狀性貧血。Mircera 尚未核准於治療因癌症化學療法引起的貧血。		

日期	110.10.15	變更項目	外瓶及刻痕變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Each tab contains: Tramadol 37.5 mg + Acetaminophen 325 mg.		
商品名	Ultracet 及通安錠		
適應症	使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。		

日期	110.10.26	變更項目	排裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Hydroxychloroquine sulfate 200 mg/Tab		
商品名	Plaquenil 必賴克屢膜衣錠		
適應症	圓盤狀及全身性紅斑性狼瘡、慢性多形日光疹、慢性風濕性關節炎、鎌狀瘧原蟲和間日瘧原蟲引起之瘧疾。		

日期	110.11.03	變更項目	排裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	MoxiFLOxacin 400mg/Tab		
商品名	Avelox 威洛速錠		
適應症	用於治療成人（十八歲以上）感受性細菌引起的感染症，包括：上呼吸道及下呼吸道感染（急性鼻竇炎、慢性支氣管炎的急性惡化、社區性肺炎），皮膚和軟組織的感染，複雜腹腔內感染(包括多種細菌感染症)。		



日期	110.11.03	變更項目	外盒印刷變更
對照	舊	新	
圖片	 <p>The image shows the old packaging for Prevenar 13 vaccine. It features a white syringe with a blue plunger and a white label. The label has the text 'Prevenar 13' in blue and red, followed by 'suspension for injection' and 'Pneumococcal saccharide conjugated vaccine adsorbed, 13-valent'. Below this, it says '1 single dose 0.5 ml per 0.5 ml syringe with separate needle.' and 'Shake well before use.' The Wyeth logo is at the bottom. Chinese text on the label reads '沛兒肺炎鏈球菌十三價結合型疫苗' and '本藥請由醫師處方使用'. There is a barcode and a small yellow sticker with 'DR 1565' on it.</p>	 <p>The image shows the new packaging for Prevenar 13 vaccine. It is similar to the old one but has a different label design. The text 'Prevenar 13' is at the top, followed by 'suspension for injection' and 'Pneumococcal saccharide conjugated vaccine adsorbed, 13-valent'. Below that, it says '1 single dose 0.5 ml per 0.5 ml syringe with separate needle.' and 'Shake well before use.' The Wyeth logo is at the bottom. Chinese text on the label reads '沛兒肺炎鏈球菌十三價結合型疫苗' and '本藥請由醫師處方使用'. There is a barcode and a small yellow sticker with 'DR 626796' on it.</p>	
學名/規格	Pneumococcal 13-valent conjugate vaccine 0.5 ml/Syringe		
商品名	Prevenar 沛兒肺炎鏈球菌十三價疫苗		
適應症	<p>可用於出生 2 個月至 17 歲嬰兒及兒童與青少年的主動免疫接種，以預防血清型 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 及 23F 肺炎鏈球菌(<i>Streptococcus pneumoniae</i>)引起的侵入性疾病。沛兒肺炎鏈球菌十三價結合型疫苗也可用於預防 2 歲以下嬰幼兒血清型 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F 及 23F 肺炎鏈球菌引起的中耳炎。本疫苗可用於 18 歲(含)以上之成人與老年人的主動免疫接種，以預防血清型 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 及 23F 肺炎鏈球菌引起的侵入性疾病和肺炎。</p>		

日期	110.11.08	變更項目	安瓶標籤變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Mirabegron 50mg/Tab		
商品名	Betmiga 貝坦利持續性藥效錠		
適應症	單一治療：治療伴有急尿、頻尿和/或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。與蕈毒鹼性拮抗劑併用：與蕈毒鹼性拮抗劑 solifenacin succinate 併用可用於治療伴有急尿、頻尿和/或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。		

日期	110.11.09	變更項目	安瓶標籤變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Etomidate 20mg/10mL/Amp		
商品名	Etomidate-Lipuro 安得力多		
適應症	靜脈注射麻醉劑。		

二、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 外觀相近。

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p>Ultracet Tab (複方)</p>	<p>Febuxostat. F.C. 80mg/Tab</p>
<p>中文商品名</p>	<p>及通安錠</p>	<p>福避痛膜衣錠</p>
<p>商品名</p>	<p>Ultracet Tab (複方)</p>	<p>Feburic F.C. 80mg/Tab</p>

三、藥物安全警訊

1. TFDA 安全警訊摘要與本院現況

(1) Phytomenadione 安全資訊風險溝通表

我國全國藥物不良反應通報中心接獲數例疑似靜脈輸注 phytomenadione 成分注射劑型藥品，導致嚴重過敏性反應 (anaphylaxis) 之不良反應通報案例。

- i. 全國藥物不良反應通報中心接獲數例於靜脈輸注 phytomenadione 期間或輸注完成後，發生嚴重過敏性反應（含過敏性休克）之不良反應通報，包含死亡與危及生命案例。
- ii. 有文獻指出，phytomenadione 成分及其助溶劑 polysorbate 80 (tween 80) 成分皆可能為導致過敏性反應的因素。此類藥品需稀釋給藥以避免快速輸注，但仍可能會發生上述不良反應，並可能於初次使用或再次投予時發生。

醫療人員應注意事項：

- i. 曾有靜脈輸注含 phytomenadione 成分注射劑型藥品，發生嚴重過敏性反應的案例，並可能造成危及生命或導致死亡之後果。於輸注該藥品期間及輸注完成後，應密切監測病人是否出現相關症狀及徵兆，並備妥相關急救設備及藥品以備不時之需。若發生過敏性反應請立即停藥，並予以適當醫療處置。
- ii. Phytomenadione 成分與所含助溶劑 polysorbate-80 成分均可能為導致過敏性反應之因素。用藥前應詢問病人是否有相關藥品過敏史。

本院現況與民眾應注意事項：

- i. 本院含有 Phytomenadione 成分之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
IVIT-K1	Katimin 1	Vit K1(Phytomenadione) 10mg/1ml/Amp	嘉體民 注射液

- ii. 曾有使用含 phytomenadione (vitamin K1) 成分注射劑型藥品後發生嚴重過敏性反應之通報案例。若您有任何相關藥品過敏史，請務必於開始藥品治療前，主動告知醫療人員。
- iii. 若您於輸注 phytomenadione (vitamin K1) 成分藥品期間或輸注完畢後出現任何不適，如皮膚紅疹或發癢、潮紅、嘴唇或舌頭腫脹、腹痛、心跳加快、喉嚨緊縮感、呼吸急促等，請立即告知醫療人員或尋求醫療協助。
- iv. 若您對用藥有任何的疑問或疑慮，請諮詢醫療人員。