



中國醫藥大學附設醫院  
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路2號

電話：(04)22052121-3154

# 藥劑快訊

## 本期目次

### 一、藥品異動資訊 (P1)

1. 臨時採購
2. 更換廠牌
3. 包裝異動

### 二、預防用藥疏失--混淆/形音相似藥 (P10)

1. 藥名相似

### 三、藥物安全警訊 (P11)


#### 1. TFDA 安全警訊摘要與本院現況


- (1) Aminoglycoside 類藥品之臨床效益及風險再評估結果相關事宜


# 一、藥品異動資訊

## 1. 臨時採購

日期	111.08.04	
學名/規格	Ropeginterferon alfa-2b 500mcg/Syr	
商品名	Besremi 百斯瑞明針筒裝注射液劑	
適應症	治療不具症狀性脾腫大之成人真性紅血球增多症病人。	
備註	血液腫瘤科臨採藥品	



日期	111.08.10	
學名/規格	Brolucizumab 19.8mg/0.165mL/Amp	
商品名	Beovu 倍優視注射劑	
適應症	治療血管新生型(濕性)年齡相關性黃斑部退化病變(Neovascular (Wet) Age-Related Macular Degeneration, wAMD)。	
備註	眼科部臨採藥品	



日期	111.08.16	
學名/規格	Lurbinectedin 4mg/Vial	
商品名	Zepzelca	
適應症	Small Cell Lung Cancer, metastatic.	
備註	血液腫瘤科專案進口臨採藥品	



日期	111.09.05	
學名/規格	Varicella Zoster Virus glycoprotein E 50 mcg/0.5 mL/Vial	
商品名	Shingrix herpes zoster vaccine 欣剋疹帶狀皰疹疫苗	
適應症	適用於下列對象，以預防帶狀皰疹及其相關併發症，如皰疹後神經痛(post-herpetic neuralgia, PHN)： - 50 歲(含)以上的成人 - 18 歲(含)以上且具有罹患帶狀皰疹風險較高的成人	
備註	社區暨家庭醫學部家庭醫學科臨採藥品	



## 2. 更換廠牌

日期	111.08.19	變更項目	由賽諾菲廠變南光廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Teicoplanin 200mg/Vial		
商品名	Targocid 得時高凍晶注射液	Tecopin 康可明靜脈注射劑	
適應症	葡萄球菌感染所致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎。		
備註	原品項缺貨，進用暫代。		

日期	111.08.26	變更項目	由高德美變為中生 技廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Adapalene Gel 0.1% 15g/Tube		
商品名	Differin Gel 痘膚潤凝膠	Tifforly Gel 蒂膚麗凝膠	
適應症	治療尋常性痤瘡。		
備註	替代。		

日期	111.09.08		變更項目	由拜耳變為南光廠
對照	舊		新	
圖片				
學名/規格	CiproFloxacin (針劑)400mg/200mL/Bot			
商品名	Ciproxin 速博新		Seforce 賜保欣注射液	
適應症	<p>成人：對 ciprofloxacin 有感受性細菌所引起之呼吸道感染、中耳炎、竇炎、眼感染、腎臟及泌尿道感染(包括淋病)、腹部感染(包括腸炎、膽囊炎、腹膜炎)、皮膚及軟組織感染、骨髓炎、關節感染、菌血症。小孩：一大腸桿菌(Escherichia coli)引起之複雜性泌尿道感染和腎盂腎炎(1-17 歲) 一綠膿桿菌(P. aeruginosa)有關之囊腫性纖維化產生急性肺部惡化的現象(5-17 歲)。成人和小孩：吸入性炭疽病(接觸後)。</p>			
備註	原品項缺貨，進用暫代。			

日期	111.09.12	變更項目	原費森尤斯卡比變專 暫進口
對照	舊	新	
圖片	 <p>The image shows a blister pack of five ampoules and a box of Cisatracurium Kabi 2 mg/ml. The box contains detailed information in English and Chinese, including the manufacturer's name (Fresenius Kabi) and the product's use for muscle relaxation.</p>	 <p>The image shows two glass ampoules of Cisatracurium-hameln 10 mg/5 mL. The ampoules are placed on a ruler for scale, showing they are approximately 5 cm high.</p>	
學名/規格	Cisatracurium 10mg/5mL/Amp	Cisatracurium-hameln 10mg/5mL/Amp	
商品名	Cisatracurium "卡比"肌鬆弛注射液	Cisatracurium-hameln	
適應症	本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為全身麻醉之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。	神經肌肉阻斷劑	
備註	原品項缺貨，進用暫代。		

日期	111.09.15	變更項目	藥之鄉變為綠十字廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Urokinase(栓塞) 60000 IU/Vial	Urokinase(栓塞) 60000 IU/Vial(綠十字)	
商品名	Urokinase(栓塞) 佑樂克栓	Urokinase(栓塞) “綠十字”血栓溶素注射劑	
適應症	急性冠狀動脈栓塞、清潔靜脈導管、急性肺栓塞。末梢動脈、靜脈栓塞症。		
備註	原品項停止供貨，進用新品項替代。		







### 3. 包裝異動

日期	111.08.25	變更項目	商標變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Ciclesonide 160mcg/puff 60doses/Bot		
商品名	Alvesco 治喘樂吸入劑		
適應症	成人、青少年及四歲以上兒童之持續性氣喘。		



日期	111.08.29	變更項目	商標變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Celecoxib 200mg/Cap		
商品名	Celebrex 希樂葆膠囊		
適應症	緩解骨關節炎之症狀與徵兆，緩解成人類風濕性關節炎之症狀與徵兆，緩解成人急性疼痛及治療原發性經痛，緩解僵直性脊椎炎之症狀與徵兆。		



日期	111.08.31	變更項目	片裝大小及印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	CO-Diovan (Valsartan80mg/_Thiazide12.5mg)		
商品名	CO-DIOVAN 可得安穩複方錠		
適應症	單一療法無法控制的高血壓，做為第二線用藥。		



日期	111.09.02	變更項目	商標變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Eplerenone 50mg/Tab		
商品名	Inspra F.C.迎甦心 膜衣錠		
適應症	心肌梗塞後之心衰竭、NYHA 第 II 級(慢性)心衰竭、高血壓。		

日期	111.09.19	變更項目	片裝大小及印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Valsartan 160mg/Tab		
商品名	Diovan 得安穩膜衣錠		
適應症	治療成人和 6-18 歲的兒童或青少年高血壓、心衰竭(NYHA 二到四級)、心肌梗塞後左心室功能異常。		

日期	111.09.19	變更項目	排裝顆數及印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Estrinol vaginal 0.5mg/Supp		
商品名	Esvatin 薇詩婷陰道錠		
適應症	陰道炎、子宮頸管炎及子宮腔部糜爛。		

## 二、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

### 1. 藥名相似

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p><b>K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub></b> <b>(K 88mEq/P 60mmol) in H<sub>2</sub>O</b> <b>100mL/Bot</b></p>	<p><b>K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 透析</b> <b>(K8.8mEq/P6mmol)inH<sub>2</sub>O</b> <b>10mL/Vial</b></p>
<p>中文商品名</p>	<p><b>磷酸鉀(K 88mEq/P 60mmol) in H<sub>2</sub>O 100mL/Bot</b></p>	<p><b>透析</b> <b>K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>(K8.8mEq/P6mmol)in H<sub>2</sub>O 10mL/Vial</b></p>
<p>商品名</p>	<p><b>磷酸鉀(K 88mEq/P 60mmol)in H<sub>2</sub>O 100mL/Bot</b></p>	<p><b>透析磷酸鉀</b> <b>(K8.8mEq/P6mmol)inH<sub>2</sub>O 10mL/Vial</b></p>

## 三、藥物安全警訊

### TFDA 安全警訊摘要與本院現況

#### (1) Aminoglycoside 類藥品之臨床效益及風險再評估結果相關事宜

因具粒線體基因突變之病人使用 aminoglycoside 類藥品可能導致耳毒性風險增加，為保障民眾用藥安全，本部依據藥事法第 48 條彙整國內外臨床文獻資料進行整體性評估，決定修訂旨揭藥品之中文仿單

- i. Aminoglycoside 類全身性投予劑型（口服及注射）藥品仿單應於「警語及注意事項」及「副作用/不良反應」等段落加刊「具粒線體基因突變病人與耳毒性風險」及「耳毒性」之相關安全性資訊，其修訂內容如下

- **警語及注意事項：**

- a. 耳毒性：使用胺基糖苷類抗生素(aminoglycosides) 可能有發生耳毒性之風險，症狀包含失去平衡、聽力喪失，這些症狀可能多為不可逆的。重要的風險因子包含腎功能不全、高劑量使用、延長治療時間或年齡（新生兒/嬰兒及年長者之風險較高）。因考量潛在之耳毒性風險，建議於治療前、治療期間，及治療後的一小段時間監測病人之前庭、耳蝸和腎臟功能。
- b. 曾有粒線體基因突變病人（尤其是 m.1555A>G 突變）：使用此類抗生素而增加耳毒性發生風險之案例，即使將抗生素之血中濃度控制在建議範圍內，仍可能發生耳毒性。有些案例與母系遺傳性的耳聾和/或粒線體基因突變相關。目前粒線體基因突變為罕見，且導致聽力損害之外顯性未明。

- **副作用/不良反應**

加刊「耳毒性」：包含前庭系統損害、暫時性聽力受損、不可逆性聽力受損、耳聾。尤其在併用其他耳毒性藥品或使用在腎功能障礙之病人。

- ii. Aminoglycoside 類耳部給藥劑型藥品仿單應於「禁忌症」段落修訂為「對本產品所含成分過敏之病人」及「鼓膜穿孔之病人」，並於「警語及注意事項」加刊「用於開放性傷口或破損的皮膚可能有造成不可逆、局部或完全的聽力受損（耳聾）之風險，且其風險隨著使用的時間增加，故不建議持續使用超過 10 日」、「副作用/不良反應」等段落加刊「具粒線體基因突變病人與耳毒性風險」及「耳毒性」之相關安全性資訊。

本院含 Aminoglycoside 類成份之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
ISTREPT	Streptomycin	Streptomycin 1g/Vial	鏈黴素注射劑
ISTR-CDC		Streptomycin(CDC) 1g/Vial	-
IAMIKAC	Amikacin sulfate	Amikacin sulfate 250mg/2mL/Amp	愛康黴素注射液
IGENTAM3	Gentamycin	Gentamicin 80mg/2mL/Vial	僅大黴素注射液
TNEOMYC1	Neomycin	Neomycin 250mg/Cap	紐奧黴素