

砷 採檢須知

急性砷中毒症狀有腹痛、血便、溶血、休克、急性肝炎、腎衰竭及抽搐；慢性中毒會有皮膚疹、胃腸症狀及末梢神經炎。

砷的暴露主要是透過食物和飲水。食物中可能含有的砷以及農藥常使用的都是有機砷，毒性比較低。飲水中的砷主要為無機的形態，毒性很強，飲水會被砷污染，有可能是地層構造的自然因素，也可能是工業污染所致。

檢驗表單	重金屬檢驗單 (CM-L502)	
檢驗項目	血中砷 Blood-Arsenic, As	尿中砷 Urine - Arsenic, As
參考範圍	2-23 µg/L	< 100 µg/L
採檢容器及 檢體量		
	Li-Heparin Tube 最低採檢量 4 ml	S-Y urine Tube 最低採檢量 5 ml
採檢 注意事項	避免凝血與溶血	請緊閉蓋子，避免外漏汙染
檢驗方法	Atomic Absorption Spectrometry	
可送檢時間	星期一至星期五 8:00 - 17:00 (例假日休)	
報告完成 時間	不含例假日，14 個工作天	
院內分機	(04) 2205-2121 轉 7613	

Pursuing Excellence
Monday, May 6, 2013